

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ.  
2017-2018 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.

11 КЛАСС

**Задания, ответы и критерии оценивания**

**1.** (7 баллов) Во время распродажи Пётр купил брюки с 40 %-ной скидкой и рубашку с 20 %-ной скидкой. На следующий день Иван купил такие же брюки и рубашку без скидок. Мог ли Иван заплатить в полтора раза больше, чем Пётр? Ответ обоснуйте.

**Ответ.** Мог.

**Решение.** Пусть брюки без скидки стоят  $x$  рублей, а рубашка без скидки стоит  $y$  рублей. Тогда Пётр заплатил  $0,6x + 0,8y$  рублей, а Иван  $x + y$  рублей. Получаем уравнение  $1,5(0,6x + 0,8y) = x + y$ , откуда  $x = 2y$ . Таким образом, если брюки стоят в два раза больше рубашки, то Иван заплатил в полтора раза больше Петра.

*Полным решением является также предъявление конкретной цены брюк и рубашки (например, 2000руб. и 1000руб.) с обоснованием того, что при такой цене условие задачи выполнено (в данном случае Пётр заплатил 2000 руб., а Иван — 3000руб.).*

**Критерии проверки.**

- Любое полное верное решение — 7 баллов.
- Приведён верный пример возможной цены брюк и рубашки, но обоснование отсутствует — 4 балла.
- Верно составлено уравнение  $1,5(0,6x + 0,8y) = x + y$ , но дальнейших продвижений нет (или они ошибочны) — 2 балла.
- Приведён только ответ — 0 баллов.

**2.** (7 баллов) Приведите пример числа  $x$ , для которого выполняется равенство  $\sin 2017x - \operatorname{tg} 2016x = \cos 2015x$ . Ответ обоснуйте.

**Ответ.** Например,  $\frac{\pi}{4}$ .


**Решение.** Так как  $\frac{2016\pi}{4} = 504\pi = 252 \cdot 2\pi$  кратно периоду, имеем

$$\begin{aligned}\sin \frac{2017\pi}{4} &= \sin(252 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{4}) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos \frac{2015\pi}{4} &= \cos(252 \cdot 2\pi - \frac{\pi}{4}) = \cos(-\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \operatorname{tg} \frac{2016\pi}{4} &= \operatorname{tg}(252 \cdot 2\pi) = \operatorname{tg} 0 = 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 &= \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

### Критерии проверки.


- Приведён верный ответ, и показано, что при этом значении  $x$  равенство верно, — 7 баллов.
- Приведён только верный ответ — 3 балла.

3. (7 баллов) Рубик сделал развертку куба размером  $3 \times 3 \times 3$  и отметил на ней две точки - см. рисунок. Каково будет расстояние между этими точками после того, как Рубик склеит из развёртки куб?



### Ответ.

**Решение.** Изобразим готовый кубик (изображение выбрано так, чтобы выделенная грань развёртки оказалась сверху). Данные точки — это две противоположные вершины кубика  $2 \times 2 \times 2$ . А в кубе  $2 \times 2 \times 2$  диагональ имеет длину  $2\sqrt{3}$ .



*Замечание.* Не обязательно использовать то, что точки являются концами диагонали куба. Можно просто изобразить получившуюся картинку и найти длину требуемого отрезка, применив пару раз теорему Пифагора (или методом координат и т. п.)

### Критерии проверки.

- Верное решение (достаточно верной картинкой и объяснения, как именно ищется расстояние между точками) — 7 баллов.
- Картинка изображена верно (возможно не с того ракурса, что в приведённом решении), но дальше расстояние найдено неверно — 3 балла.
- Приведён только верный ответ — 0 баллов.
- Допущена ошибка при определении местонахождения точек на кубе — 0 баллов.

4. (7 баллов) Существуют ли такие три действительных числа, что если их поставить в одном порядке в качестве коэффициентов квадратного трёхчлена, то он будет иметь два различных положительных корня, а если в другом порядке, то два различных отрицательных корня?

**Ответ.** Нет.

**Решение.** Пусть у трёхчлена  $ax+bx+c$  два отрицательных корня  $x_1$  и  $x_2$ . Тогда  $b/a = -(x_1+x_2) > 0$  и  $c/a = x_1x_2 > 0$ , то есть числа  $b$  и  $c$  того же знака, что и число  $a$ . Допустим, как-то переставив коэффициенты, мы получили уравнение с двумя положительными корнями. Но тогда частное от деления коэффициента при  $x$  на коэффициент при  $x^2$  должно было бы стать отрицательным, а частное от деления двух чисел одного знака положительно. Противоречие.


**Критерии проверки.**

- Любое полное верное решение — 7 баллов.
- Решение, основанное на неполном переборе возможных знаков коэффициентов, — 2 балла.
- Приведено несколько конкретных числовых примеров коэффициентов, и сделан правильный вывод — 1 балл.
- Ответ «нет» без обоснования — 0 баллов.

**5. (7 баллов)** Из середины каждой стороны остроугольного треугольника площади  $S$  проведены перпендикуляры к двум другим сторонам. Найдите площадь шестиугольника, ограниченного этими перпендикулярами.

**Ответ:**  $0,5S$

**Решение.**



1. Обозначим вершины исходного треугольника буквами  $X, Y, Z$ , середины сторон — буквами  $A, B, C$ , точки пересечения перпендикуляров —  $K, L, N$ . Площадь искомого шестиугольника равна сумме площадей треугольника  $ABC$  и трёх маленьких треугольников, примыкающих к его сторонам:  $AKB, BLC, CNA$ .
2. Так как средние линии треугольника  $XYZ$  разбивают его на 4 равных треугольника, площадь треугольника  $ABC$  равна  $0,25S$ .
3. Проведём в треугольнике  $ABC$  отрезки высот до точки их пересечения  $H$ . Так как средняя линия  $BA$  параллельна стороне  $YZ$ , проведённые к ним перпендикуляры  $CH$  и  $AN$  также параллельны. Рассуждая аналогично, получаем, что  $AH \parallel CN$ , и, значит,  $AHCN$  — параллелограмм.
4. Диагональ  $AC$  разбивает параллелограмм  $AHCN$  на два равных треугольника, следовательно, площади треугольников  $AHC$  и  $ANC$  равны. Точно так же равны площади треугольников  $AHB$  и  $AKB$  и площади треугольников  $CHB$  и  $CLB$ .
5. Отсюда получаем, что искомая площадь в два раза больше площади треугольника  $ABC$  и равна  $0,5S$ .

*Замечание.* Исходный треугольник должен быть остроугольным, чтобы все высоты проходили внутри соответствующих треугольников.

**Критерии проверки.**

- Любое полное верное решение — 7 баллов.
- Равенство всех нужных фигур (и площадей) доказано, но площадь не найдена — 4 балла.
- Приведено верное разбиение шестиугольника на части, но равенство фигур никак не обосновывается, а только утверждается, и получен верный ответ — 3 балла.
- Ответ  $\frac{S}{2}$  без обоснования — 1 балл.

**6.** (7 баллов) Если на доске записано число  $A$ , к нему можно прибавить любой его делитель, отличный от 1 и самого  $A$ . Можно ли из  $A = 4$  получить 1234321?

**Ответ.** Можно.

**Решение.** Прибавить к числу его делитель  $n$  — это значит к числу вида  $kn$  добавить  $n$ . Получится число вида  $(k+1)n$ . Заметим, что число 1234321 делится на 11. Тогда к числу  $A = 4 = 2 \cdot 2$  будем добавлять 2 до тех пор, пока не получим число  $2 \cdot 11$ :  $2 \cdot 2 \rightarrow 2 \cdot 3 \rightarrow 2 \cdot 4 \rightarrow 2 \cdot 5 \rightarrow \dots \rightarrow 2 \cdot 11$ . А затем будем добавлять 11:

$$2 \cdot 11 \rightarrow 3 \cdot 11 \rightarrow 4 \cdot 11 \rightarrow 5 \cdot 11 \rightarrow \dots \rightarrow 12211 \cdot 11 = 1234321.$$

**Критерии проверки.**

- Любой верный алгоритм получения числа — 7 баллов.
- Есть идея, как получить число, кратное собственному делителю числа 1234321, — 3 балла.
- Ответ «да» без обоснования — 0 баллов.

**Максимальный балл за все выполненные задания — 42.**